

Др. Володимир Левицький.

До теорії інтегральних рівнянь.

(Dr. Wladimir Lewyékyj: Zur Theorie der Integralgleichungen).

1. а. Возьмім під увагу рівняння Фредгольма другого рода:

$$\varphi(x) + \lambda \int_a^b K(xs) \varphi(s) ds = f(x)$$

і заложім, що ядро $K(xs)$ є лише функцією змінної x , т. є. $K(xs) = K(x)$, однозначною і тяглою в інтервалі інтегрування, а $f(x) = \mu K(x)$, де μ є постійний параметр. Обмежимося притім на дійсну царину. Тоді є:

$$\varphi(x) + \lambda \int_a^b K(x) \varphi(s) ds = \mu K(x). \quad 1)$$

Щоби найти розв'язку цього рівняння, напишім 1) в виді:

$$\varphi(x) + \lambda K(x) \int_a^b \varphi(s) ds = \mu K(x)$$

або:

$$\varphi(x) + \lambda C K(x) = \mu K(x), \quad 2)$$

де:

$$C = \int_a^b \varphi(s) ds.$$

Щоби найти постійне C , з'інтегруймо рівняння 2) зглядом x в границях $(a..b)$; тоді з огляду на се, що:

$$\int_a^b \varphi(x) dx = C$$

дістанемо:

$$C + \lambda \int_a^b K(x) dx = \mu \int_a^b K(x) dx,$$

а звідси дістанемо вартість постійного:

$$C = \frac{\mu \int_a^b K(x) dx}{1 + \lambda \int_a^b K(x) dx} \quad 3)$$

В сей спосіб C є точно означене — коли вид функції $K(x)$ є звісний. В виду цього:

$$\varphi(x) = (\mu - \lambda C) K(x) = m K(x) \quad 4)$$

Розвязкою інтегрального рівняння 1) є отже само ядро, помножене постійним числом.

б: Коли рівняння 1) напишемо при помочі розвязуючого ядра $\mathfrak{K}(x)$, то після звісної теорії буде:

$$\varphi(x) = f(x) - \lambda \int_a^b \mathfrak{K}(x) f(s) ds,$$

отже в нашім случаю:

$$m K(x) = \mu K(x) - \lambda \mathfrak{K}(x) \int_a^b f(s) ds,$$

а що:

$$\int_a^b f(s) ds = \mu \int_a^b K(s) ds,$$

то дістанемо:

$$\mathfrak{K}(x) = \frac{\mu - m}{\mu \lambda} \frac{K(x)}{\int_a^b K(s) ds} = n K(x),$$

значить: розвязуюче ядро є також рівне ядру рівняння 1), помноженому постійним числом.

2. Як примір вовьмім случай, що

$$K(x) = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \quad 5)$$

отже є рівне лінійній субституції, причім:

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} = 1,$$

а границі інтегровання a, b не є рівні $-\frac{\delta}{\gamma}$. Тоді дістанемо рівнання :

$$\varphi(x) + \lambda \int_a^b \frac{ax + \beta}{\gamma x + \delta} \varphi(s) ds = \mu \frac{ax + \beta}{\gamma x + \delta} \quad (6)$$

або :

$$\varphi(x) + \lambda \int_a^b \frac{ax + \beta}{\gamma x + \delta} \varphi(s) ds = \mu \frac{ax + \beta}{\gamma x + \delta}$$

т. є.

$$\varphi(x) + \lambda C \frac{ax + \beta}{\gamma x + \delta} = \mu \frac{ax + \beta}{\gamma x + \delta}$$

Після 3) є :

$$C = \frac{\mu \int_a^b \frac{ax + \beta}{\gamma x + \delta} dx}{1 + \lambda \int_a^b \frac{ax + \beta}{\gamma x + \delta} dx}$$

Інтеграл :

$$J = \int_a^b \frac{ax + \beta}{\gamma x + \delta} dx$$

дає :

$$\begin{aligned} J &= \frac{a}{\gamma} \int_a^b \frac{x + \frac{\beta}{a}}{x + \frac{\delta}{\gamma}} dx = \frac{a}{\gamma} \int_a^b \left[1 + \left(\frac{\beta}{a} - \frac{\delta}{\gamma} \right) \frac{1}{x + \frac{\delta}{\gamma}} \right] dx = \\ &= \frac{a}{\gamma} \int_a^b \left[1 - \frac{1}{a\gamma} \frac{1}{x + \frac{\delta}{\gamma}} \right] dx = \frac{a}{\gamma} (b - a) - \frac{1}{a\gamma} \log \frac{b\gamma + \delta}{a\gamma + \delta}. \quad (7) \end{aligned}$$

Так як ми обмежаємося лише на царину дійсних чисел, то беремо лише головну вартисть льогаритма. В зложеній царині дорогу інтегровання $(a..b)$ треба заступати якоюсь кривою L , що іде через a і b і не переходить через точку O ; тоді льогаритм дістає додаток $\pm \frac{1}{2} \pi i$, отже постійне C , а тим самим і сама функція $\varphi(x)$ стає многозначна і залежить від довільного параметра v .

312

В виду 7) дістанемо тепер:

$$C = \frac{\mu(ac\gamma - d)}{\gamma^2 + \lambda(ac\gamma - d)}. \quad 8)$$

де:

$$c = (b - a), \quad d = \log \frac{b\gamma + \delta}{a\gamma + \delta}.$$

Тепер розв'язкою рівняння 6) буде функція:

$$\varphi(x) = \frac{ax + \beta}{\gamma x + \delta} (\mu - \lambda C) = h \frac{ax + \beta}{\gamma x + \delta} \quad 9)$$

т. є. також лінійна субституція, якої визначник має вартість h .

Коли доберемо параметри λ і μ так, щоби:

$$\gamma^2(\mu - 1) = \lambda(ac\gamma - d),$$

тоді:

$$h = \mu - \lambda C = 1,$$

а в тім случаю розв'язкою рівняння 6) є найпростійша лінійна субституція (о визначнику 1).

3. До цього висліду можна дійти ще і в інший спосіб. З рівняння 2) утворім першу, другу і трету похідну, то:

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= (\mu - \lambda C) K'(x) \\ \varphi''(x) &= (\mu - \lambda C) K''(x) \\ \varphi'''(x) &= (\mu - \lambda C) K'''(x).\end{aligned}$$

Звідси :

$$\frac{\varphi'''(x)}{\varphi'(x)} = \frac{K'''(x)}{K'(x)},$$

або з огляду на те, що $K(x) = \frac{ax + \beta}{\gamma x + \delta}$, $\begin{vmatrix} a & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} = 1$

$$\frac{\varphi'''(x)}{\varphi'(x)} = \frac{6\gamma^2}{(\gamma x + \delta)^2},$$

так само :

$$\frac{\varphi''(x)}{\varphi'(x)} = -\frac{2\gamma}{\gamma x + \delta}.$$

Утворім тепер шварція н функції $\varphi(x)$, т. є.

$$\left\{ \varphi(x), x \right\} = \frac{\varphi'''(x)}{\varphi'(x)} - \frac{3}{2} \left(\frac{\varphi''(x)}{\varphi'(x)} \right)^2$$

то дістанемо:

$$\left\{ \varphi(x), x \right\} = 0, \quad 10)$$

а се доказує, що $\varphi(x) \in$ взагалі рівне лінійній субституції
 $h \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$, яка є розвязкою рівняння 10).

Львів, в маю 1919.

INHALT. Eine Integralgleichung von der Form:

$$\varphi(x) + \lambda \int_a^b K(x) \varphi(s) ds = \mu K(x)$$

wo der Kern $K(x)$ eine stetige, eindeutige Funktion im Intervalle $(a..b)$ im reellen Gebiete der Veränderlichen darstellt, hat als Lösung den Kern $\tilde{K}(x)$ selbst, multipliziert mit einer Konstanten. Dann ist auch der Kern $\mathfrak{K}(x)$ der resolvierenden Glg:

$$\varphi(x) = f(x) - \lambda \int_a^b \mathfrak{K}(x) f(s) ds.$$

dem Kern $K(x)$ — multipliziert mit einer Konstanten — gleich.
 Als Beispiel nimmt der Verfasser den Kern $K(x) = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$
 (lineare Substitution); die Richtigkeit der Lösung ist auch aus der Schwarz'schen Ableitung der obigen Integralgleichung ersichtlich.