

В. ЛЕВИЦЬКИЙ (Львів).

## Евольвента цисоїди.\*)

Коли маємо рівняння цисоїди

$$\xi(\xi^2 + \eta^2) = 2r\eta^2, \quad 1).$$

тоді знайдемо її евольвенту, коли вилінуємо  $\xi$  та  $\eta$  з рівняння 1) і рівнянь:

$$\xi = x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''}, \quad \eta = y + \frac{1+y'^2}{y''}. \quad 2).$$

Напишім рівняння 1) у виді:

$$\eta^2 = \frac{\xi^3}{2r - \xi},$$

тоді різничкове рівняння евольвенти дістане форму:

$$\left[ y + \frac{1+y'^2}{y''} \right]^2 = \frac{\left[ x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''} \right]^3}{2r - \left[ x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''} \right]}. \quad 3).$$

Щоби це рівняння з'інтегрувати, покладім:

$$y = a \pm \sqrt{b^2 - (x-c)^2} \quad 4).$$

де  $a$ ,  $b$  є якісь сталі.

Тоді дістанемо:

$$y' = \pm \frac{(x-c)}{\sqrt{b^2 - (x-c)^2}}, \quad y'' = \pm \frac{b^2}{\left[ b^2 - (x-c)^2 \right]^{\frac{3}{2}}}$$

$$\xi = x - (x-c) = c, \quad \eta = a.$$

\*) пор. розвідки автора: 1) До теорії евольвенти (Збірник математ. природн. лікарск. секції т. XXI). 2) Кривина евольвенти (ibid. т. XXIII.—XXIV). 3) La spirale logarithmique et sa développante (ibid. т. XXVII). 4) Трактриса як евольвента ланцевої лінії (Записки Київськ. Инстит. Народн. Освіти 1928). 5) La astroïde y su envolvente (Revista de Ciencias, Lima 1931).

Рівняння 1) дає в виду цього:

$$\begin{aligned} c(c^2 + a^2) &= 2ra^2, \\ c^3 &= a^2(2r - c) \\ a^2 &= \frac{c^3}{2r - c}, \quad a = \pm \frac{c\sqrt{c}}{\sqrt{2r - c}}. \end{aligned} \quad 5).$$

Тоді дістанемо з 4):

$$y = \pm \frac{c\sqrt{c}}{\sqrt{2r - c}} \pm \sqrt{b^2 - (x - c)^2}$$

або:

$$\left[ y \pm \frac{c\sqrt{c}}{\sqrt{2r - c}} \right]^2 = b^2 - (x - c)^2,$$

а з цього вкінці слідує:

$$(x - c)^2 + \left( y \pm \frac{c\sqrt{c}}{\sqrt{2r - c}} \right)^2 = b^2. \quad 6).$$

Отже:

Евольвенти цисоїди творять подвійну громаду кіл.